



پروژه 2018-2020 Niitty

[/https://projects.tuni.fi/niitty/](https://projects.tuni.fi/niitty/)

[/www.facebook.com/niittyhanke/](https://www.facebook.com/niittyhanke/)

مدیر پروژه Irmeli Nieminen: ایمیل: irmeli.nieminen@tuni.fi
 متخصص Anna Aikasalo: ایمیل: anna.aikasalo@tuni.fi
 متخصص Jasmin Kaljadin: ایمیل: jasmin.kaljadin@tampere.fi

منابع و اطلاعات بیشتر:

www.thl.fi/en/web/thlfi-en - موضوعات - واکسیناسیون

Niitty - تدوین مدل آموزش خانوادگی گروهی ویژه
 مهاجرین

واکسیناسیون برای کودکان مهاجر زیر 2 سال

Rokotteet alle 2-vuotiaille maahanmuuttajille



واکسیناسیون در فنلاند تا دو سالگی صورت می گیرد:

سن کودک	واکسیناسیون
2 ماهگی، 3 ماهگی، 5 ماهگی	روتاویروس از کودکتان در برابر اسهال روتاویروس محافظت می کند. واکسن به صورت دهانی داده می شود.
3 ماهگی، 5 ماهگی، 12 ماهگی	واکسن کونژوگه پنوموکوکی (PCV) از کودک شما در برابر مننژیت، ذات الریه، مسمومیت خون و عفونت گوش محافظت می کند.
3 ماهگی، 5 ماهگی، 12 ماهگی	واکسن 5 گانه (DTaP-IPV-Hib) از کودکتان در برابر دیفتیری، کزاز، سیاه سرفه، فلج اطفال و هموفیلوس آنفولانزا نوع ب (مانند مننژیت) محافظت می کند
12 تا 18 ماهگی	MMR از کودکتان در برابر سرخک، اوریون و سرخچه محافظت می کند.
از 6 ماهگی	آنفولانزا
از 18 ماهگی	آبله مرغان اگر فرزندان شما قبلاً به این بیماری مبتلا نشده باشد با این واکسن از فرزند خود محافظت کنید.

واکسیناسیون یکی از مهمترین و مؤثرترین روش ها در زمینه تقویت، حفظ و محافظت از سلامت کودک است. واکسیناسیون کودک را در برابر بیماری های جدی محافظت می کند.

در فنلاند، همه افراد از حق واکسیناسیون برخوردارند و انجام آن رایگان است.

بیشتر واکسن ها به صورت عضلانی، مثلاً در ران تزریق می شوند.

در صفحه بعد فهرستی از واکسن هایی را مشاهده خواهید کرد که در فنلاند به افراد تا سن دو سالگی تزریق می شود.

تزریق واکسن های ذیل به مهاجران ضروری است. می توانید اطلاعات بیشتری درباره واکسیناسیون مورد نیاز فرزندان در کلینیک سلامت کودک یا مرکز بهداشت کسب کنید.

واکسیناسیون	برای چه کسی است؟
سل (ب ث ژ)	کودکی زیر 7 سال که: - از اردوگاه پناهندگان یا به عنوان پناهجوی قاچاق وارد فنلاند شده است - در یک مرکز پذیرش زندگی می کند - در کشور مبدأ والدینش، سل وجود دارد
فلج اطفال (IPV)	متخصصان خدمات درمانی، پوشش فعلی واکسن فرد را ارزیابی می کنند و در صورت لزوم واکسن تکمیلی را تزریق می کنند.
هپاتیت ب	در صورتی که یکی از والدین کودک از کشوری آمده باشد که هپاتیت ب در آن شیوع دارد.

